



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N°17/2020 del 06/08/2020

Speciale Tignoletta agosto 2020

Il volo della terza generazione della tignoletta è iniziato due settimane fa.

| DATA | Capra | | | Totale catture Capra | Roverone | | | Totale catture Rover. | Valbissera | | | Totale catture Valbissera | Cà del Mazza | | | Totale catture Cà del Mazza | Corà | | | Totale catture Corà | |
|--------|-------|----|---|----------------------------|----------|----|----|-----------------------------|------------|----|----|---------------------------------|-----------------|----|---|--------------------------------------|------|---|----|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23-lug | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 15 | 15 | 4 | 34 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 5 | 13 | 29 | |
| 27-lug | 4 | 3 | 0 | 7 | 12 | 12 | 10 | 32 | 20 | 12 | 9 | 41 | 4 | 3 | 1 | 8 | 32 | 8 | 16 | 52 | |
| 30-lug | 12 | 4 | 0 | 16 | 10 | 5 | 4 | 19 | 23 | 10 | 5 | 38 | 2 | 5 | 4 | 11 | 34 | 4 | 7 | 45 | |
| 03-ago | 32 | 10 | 4 | 46 | 14 | 18 | 18 | 50 | 65 | 24 | 20 | 109 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | 1 | 3 | 18 | |
| 08-ago | 24 | 12 | 4 | 40 | 12 | 9 | 8 | 29 | 27 | 20 | 23 | 70 | 6 | 18 | 8 | 32 | 7 | 5 | 16 | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sono state posizionate 3 trappole per ogni zona

Il volo nell'ultima settimana molto probabilmente è stato disturbato dalle alte temperature del fine settimana scorsa e dai forti temporali di lunedì scorso (totale pioggia caduta 46,0 mm).

In zona Valbissera le maggiori catture, indicano un picco del volo nei giorni fra venerdì 31 luglio e lunedì 03 agosto, mentre nelle altre zone catture inferiori, ma che indicano la presenza della terza generazione.

Sono catture importanti ma non così numerose come lo scorso anno; indicano l'andamento del volo della terza generazione che varia molto da zona a zona; la scelta di effettuare un trattamento deve essere supportata da un controllo in vigneto, soprattutto in quelle zone dove negli anni passati c'è stata un'alta presenza della tignoletta e dove si sono visti fori di penetrazione delle larve della seconda generazione. Se ogni 100 grappoli si trovano più di 5 uova o 5 larve di tignoletta è consigliabile fare un trattamento.

Il riferimento riportato dai principi attivi, in merito a come funzionano e al loro posizionamento, vale a dire quando utilizzarlo, ha valore orientativo e può essere scelto con maggiore precisione solamente attraverso accurati monitoraggi in vigneto o supportato dalle trappole a feromoni posizionate nei singoli appezzamenti.

Varie.

- **Nell'effettuare gli ultimi trattamenti controllare il tempo di carenza dei principi attivi utilizzati**
- **Per aiutare la vite, stressata dal caldo, dalla siccità e dalla poca umidità l'uso di concimi fogliari possono servire per integrare il difficile assorbimento e mantenere attivo l'apparato fogliare.**
- **E' possibile segnalare la presenza di vigneti abbandonati non trattati al Servizio Agricoltura-Parco del Comune di San Colombano indicando foglio-mappale e proprietario del terreno**

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, cel. 3387504596, Federico cel. 338 5828793
Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano

LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA E' COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE