



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 3/2021 del 12/05/2021

Fase fenologica. Con tempo stabile della settimana scorsa, e temperature medie in leggero aumento i germogli hanno continuato il loro sviluppo, conservando però ancora alcune differenze con i fondivalle e le zone di alta collina. Nelle posizioni più favorevoli si può notare la fase di allungamento dei grappoli.

Peronospora.

Le condizioni climatiche di stabilità meteorologica e una umidità relativa bassa della settimana scorsa non hanno favorito l'instaurarsi di nuove infezioni. Temperature in rialzo e piogge superiori ai 10 mm possono, potenzialmente, far partire infezioni primarie. Viste le attuali previsioni meteorologiche con piogge nella giornata di martedì 11 maggio, circa 15 mm, e che prevedono un periodo di instabilità, prima dello scadere del p.a. di solo copertura, si consiglia di ripristinare la protezione della vite, importante quindi controllare le previsioni meteorologiche. Nel caso che le prossime piogge infettanti cadano su vegetazione non protetta si consiglia l'impiego di prodotti contenenti *cimoxanil*, *dimetomorf*, *fenilammidi* (*benalaxil-M*, *metalaxil-M*) da effettuare entro 24-48 ore dall'evento infettante.

Oidio. Si consiglia di aggiungere in miscela al prodotto antiperonosporico, un p.a. di pari persistenza, avendo cura di alternare il p.a. per evitare resistenze. Nei vigneti ad alta suscettibilità della malattia si consiglia di intervenire con *meptyl-dinocap*, *spiroxamina* già dalle prime fasi del germogliamento.

Varie.

- Con nota protocollo Z1.2021.0013255 del 29 Aprile 2021, il Direttore Generale al Territorio e Protezione Civile ha dichiarato terminato il periodo di alto rischio incendi boschivi con decorrenza immediata. **Per tanto si possono bruciare i cumoli dei residui di potatura portando comunque la massima attenzione e presidiando la bruciatura.**
- Se si osservano sintomi dovuti a carenze nutrizionali, in particolare azoto e potassio, intervenire con concimazioni fogliare mirate.
- **Importante:** piogge superiori ai 25-35 mm vanno considerate piogge dilavanti dei p.a. di solo copertura e serve ripristinare il trattamento.
- **Importante:** rispettare e controllare le dosi riportate in etichetta e successivamente impiegate ad ettaro, nonché osservare la giusta distribuzione del fitofarmaco sulla vegetazione.
- Continuare i lavori di scacchiatura e spollonatura.
- Con situazioni di alto rischio di infezioni peronosporiche, effettuare la trinciatura dell'erba solo a vegetazione ben protetta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola cel. 3387504596, Federico cel. 338 5828793